

Hand Medical Library

al
EIN FALL VON
YSTICERCUS CELLULOSAE
IM MESENTERIUM DES MENSCHEN.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER

DOCTORWUERDE IN DER MEDICIN, CHIRURGIE UND
GEBURTSHUELFE,

WELCHE

NEBST BEIGEFUEGTEN THESEN

MIT ZUSTIMMUNG

DER HOHEN MEDICINISCHEN FACULTAET GREIFSWALD

AM

3. AUGUST 1874

OEFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

FELIX OBERLAENDER

AUS DRESDEN.

LEIPZIG

DRUCK VON GRAICHEN & RIEHL.

SEINER

THEUERN MUTTER

IN

KINDLICHER LIEBE UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM

VERFASSER.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Obgleich unter den Blasenwürmern der *Cysticercus cellulae* in Bezug auf sein Vorkommen in den verschiedensten Organen die grösste Verbreitung zeigt, so ist doch die Zahl der Fälle, wo derselbe im Mesenterium seinen Sitz aufgeschlagen hat, bis jetzt noch eine sehr kleine. Dieser Umstand dürfte daher die Mittheilung des nachfolgenden Falles als genügend gerechtfertigt erscheinen lassen. Der Fall ist folgender:

Am 27. Januar 1862 wurde auf der Greifswalder medizinischen Klinik, damals unter der Direction des Professor Hildebrandt, der 19jährige Fleischergeselle Karl Keipe aufgenommen, welcher über Schwächegefühl, Kopfschmerz, Durchfall und Heiserkeit klagte. Die Anamnese ergab, dass Patient in seinem 19. Lebensjahre kurze Zeit an Febris intermittens gelitten hatte, sonst stets gesund gewesen ist. Das gegenwärtige Unwohlsein begann vor 14 Tagen mit Schwächegefühl, Kopfschmerz, Durchfall und etwas Husten, zu denen sich seit 3 Tagen noch Heiserkeit gesellte.

Der Status praesens war folgender: Zunge sehr roth, trocken, leicht zitternd, ebenso die Mundschleimhaut, Zahnfleisch mit einem schmalen, rothen Saume. Leib weich, nicht aufgetrieben, Epigastrium etwas schmerzhaft, die Coccalgegend schmerzlos, kein Gurren. Am Rippenbogen rechts einige, links nur ein wenig erhabener, auf Druck verschwindender rother Flecken. Herz tritt bei tiefen Inspirationen unter dem Rippenbogen hervor. Dämpfung in der Axillarlinie bis zur 7. Rippe: 11½ Centimeter. Leberdämpfung in normaler Höhe ragt bis zum Rande des Rippenbogens. Percussionsschall war am Thorax voll, Lungengeräusch scharf vesiculär mit etwas Pfeifen. Herzdämpfung normal gross; Herztöne schwach, erster Ton an der Spitze etwas blasend, keine Verstärkung des 2. Pulmonaltones; zweite überhaupt etwas schwach. Am Rücken in der fossa supracostalis links schwache Dämpfung, auch hier Pfeifen, vesiculäres Athmen. Sputa theils hell, durchscheinend glasig, theils etwas

eitrig mit spärlichen Blutspuren. Beim Druck auf den Kehlkopf empfindet Patient Schmerz, besonders in den hintern Partien Gaumenbögen, Zäpfchen und hintere Rachenwand geröthet. Schmerzen beim Schlingen nicht vorhanden. Harn spärlich hellbraun, enthält Urate.

Die Temperatur betrug am Abend nach der Aufnahme 40,7, der Puls 108. Ebenso an den folgenden Tagen bis zum 11. Februar war die Temperatur des Morgens ein oder zwei Zehntel Grad über oder unter 40°, Abends hingegen fand eine regelmässige Exacerbation statt, die zwischen 39°,9 und 40° schwankte. Dabei klagte Patient öfter über Schwirren vor den Augen und Summen im Kopfe. Die Stühle zeigten die charakteristische typhöse Beschaffenheit, sie waren dünnbreiig, erbsengelb, fäculent täglich 3—4 Mal, auch Nachts finden 2—3 Mal Entleerungen statt. Das Abdomen ist etwas meteoristisch aufgetrieben und auf der rechten Seite empfindlich. Die Milzdämpfung vergrössert. Die Lippen sind trocken, fuliginös belegt, Zunge ebenfalls trocken, in der Mitte roth, zittert stark beim Herausstrecken und wird träge eingezogen. Das Sensorium ist immer frei, Schlaf gut. Die Heiserkeit besteht in gleicher Weise fort. Der Bronchialkatarrh hat sich ebenfalls nicht verschlimmert, die Sputa sind glasig, zäh, weiss. Der Harn dunkelbraun, mit wenig Sediment, ohne Eiweiss.

Vom 11. Februar ab bis zum 24., wo der Exitus lethalis erfolgte, war der Morgen stets fieberfrei, Abends jedoch fanden dieselben Exacerbationen wie vorher statt, nur stieg die Temperatur bloss bis 40°,5. Die Typhusstühle bleiben in Quantität und Qualität fast gleich. Der Milztumor ist etwas geschwunden. Sensorium immer noch ungetrückt, dagegen folgen Nachts oft starke Schweisse, die den Kranken sehr schwächen. Der Bronchialkatarrh nimmt zu, heftiger Husten und Heiserkeit, Beschwerden beim Schlingen, oft tritt Verschlucken ein. Die Sputa reichlich, theilen sich in drei Schichten, obere enthält geballte, gelbe nach unten fetzige Sputa, in der Mitte sind gelbgrüne, unklare, schleimige und am Boden des Gefässes befindet sich ein reichlicher Niederschlag von graugelben, gelben, krümeligen Massen, die sich unter dem Mikroskop als Detritus, Eiter und Schleimkörperchen ergeben. Dabei riechen dieselben widerlich leimartig. Die Percussion des Thorax ergiebt nie eine Anormalität; die Auscultation an verschiedenen Stellen Pfeifen, Rasseln und Schnurren. Am 20. Februar treten zum ersten Mal dyspnoëtische Erscheinungen auf und Patient collabirt sichtlich. Puls ist klein und frequent. Die Sputa bilden einen schmierigen, schleimigen Brei, der einen äusserst fötiden Geruch hat. Am 23. und 24. hat die Dyspnoë stark zugenommen. Patient athmet mit

abgetretenem Larynx, wobei ein deutlicher Stridor eintritt. Die laryngoskopische Untersuchung ergiebt die Epiglottis gehoben, etwas zur Fläche gebogen und an den Rändern mit Erosionen bedeckt.

Verschlucken mit rauhem kurzen Husten ist Regel. Patient etwas benommen, doch nimmt er noch die ihm gereichten Speisen. Das Gesicht zeigt eine ausgesprochen cyanotische Färbung der Lippen und Wangen. Am Abend des 24. ass Patient noch seine Suppe, wurde dabei plötzlich ganz livid gefärbt, ohne dass ein acutes Hinderniss für die Athmung nachweisbar war, vielmehr holte Patient noch mehreremal tief ein, entleerte dabei einfach wässrige Massen aus dem Munde und verschied.

Wie sich bei der Autopsie ergab, war der Tod suffocatorisch durch erfolgt, dass der grösste Theil der genossenen Suppe in die Bronchien gedrungen war. Am 25. Februar Morgens 10 Uhr wurde von Herrn Prof. Dr. Grohe die Obduction gemacht, welche Folgendes sehr interessante Resultat ergab: Der Körper sehr abgemagert, das Unterhautfettgewebe fast vollständig geschwunden. Todtenstarre an obern und untern Extremitäten deutlich ausgesprochen. In der Muskulatur des Thorax zahlreiche Cysticerken. Herz gross, rechts schlaff, sehr fettig, in beiden Vorhöfen sehr reichliches, wässriges dunkles Blut, mit wenig weichen Faserstoffgerinnseln. Die Wand des linken Ventrikels dünner als normal, Muskulatur blass, graulich, anämisch; Endocardium leicht verdickt, besonders am Septum Mitralis und Aortaklappen sehr dünn ohne weitere Veränderung. Muskulatur rechts dünner als normal, von gleichmässiger blassgraurother Farbe, Klappen normal. Beide Lungen stark aufgebläht mit der Thoraxwand und dem Diaphragma verwachsen. Lunge rechts umfangreich, im ganzen obern Lappen sehr stark aufgebläht und sehr unelastisch, Oberfläche blass grau-roth, sehr pigmentarm, in den untern Partien zahlreiche atelectatische Stellen. Im untern Lappen Oedem und Emphyse. In grossen und kleinen Bronchien neben schaumig grösser Flüssigkeit schmutzig graugelbe Massen, die den Charakter von verschlucktem Mageninhalt haben. Gegen den Hilus des obern und untern Lappens hin einige lobuläre Infiltrationen. Die Bronchien im mittleren und untern Lappen cylindrisch erweitert, ihre Wandungen verdickt, nach Abspülen mit Wasser ist die Schleimhaut mit zahlreichen feinen Zöttchen und papillären Excrescenzen besetzt, welche dem Schleimhautgewebe fest aufsitzen. Die Länge der Zöttchen beträgt 1—2 Linien, dieselben sitzen theils vereinzelt, theils in kleinern und grössern Gruppen von Hirse- und Hanfkorngrösse bis zu 3—4 Linien Durchmesser beisammen, sowohl auf der freien Fläche,

als auch auf der Theilungsstelle der Bronchien, wodurch die Lumina der abgehenden kleineren Aeste in verschiedenen Graden verengt werden. Bronchialschleimhaut in den obern Lappen im ganzen blass, nur an einigen Stellen etwas geröthet. Die linke Lunge zeigt sowohl von Aussen als auf Durchschnitten dieselben Verhältnisse; desgleichen auch die Bronchien. Ausserdem befinden sich in derselben inmitten des Parenchyms sowie auch an der Pleura zwischen mittlern und obern Lappen je eine Cysticercusblase von mittlerer Grösse. Bei Herausnahme der Halseingeweide zeigt sich folgendes: Zunge mit blassgrauem Belage versehen, Tonsillen nicht verändert. Lig. aryepiglottica in ihrer hintern Hälfte stark geschwellt. Oberfläche des linken mit zahlreichen kleinen Ulcerationen bedeckt, Schleimhaut der Epiglottis zeigt nichts besonderes, dagegen die Morgagnischen Ventrikel stark ödematös. Die obern Stimmbänder normal, die untern Stimmbänder zeigen in ihrer hintern Insertion mehrere linsengrosse ziemlich tiefgehende Geschwüre und rechts in der Tiefe ist der von Weichtheilen entblösste Arytaenoid-Knorpel sichtbar.

In der Bauchhöhle ein halbes Quart klarer seröser Flüssigkeit. Omentum vollkommen fettlos. Magen durch Gas stark ausgedehnt, in vertikaler Stellung. Die Dünne- und Dickdärme liegen stark contrahirt in der kleinen Beckenhöhle. Mesenterialdrüsen stark vergrössert, auf dem Durchschnitten beide Substanzen blass braunroth. Daneben ist das ganze Mesenterium, besonders am Ileocoecalstrang theils mit isolirten, theils mit kirsch- bis wallnussgrossen Gruppen vereinigten Cysticercusblasen bedeckt, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind, in der die zusammengedruckten Körper des Wurms als ein gelblich runder Fleck deutlich sichtbar ist.)*

Milz 5 Zoll lang, 3 Zoll breit, $1\frac{1}{2}$ Zoll dick, Pulpa sehr fest, derb, gleichmässig braunroth, Malpighische Bläschen sehr zahlreich, ziemlich gross, sehr scharf begrenzt. Die Untersuchung des Dünndarms ergab unmittelbar über der Ileocoecalclappe und im Ileum zahlreiche, theilweise in Vernarbung begriffene typhöse Geschwüre, daneben auch noch eine starke Schwellung der solitären Drüsen.

Geschwüre finden sich nur im untern Theile des Ileums. Im Anfang des Jejunum eine 3 Finger lange Invagination. Die Schleimhaut des Jejunum, Duodenum und Magens zeigt nichts besonderes. Fettkapsel beider Nieren vollständig geschwunden, Nieren selbst klein, plattgedrückt, Rinden- und

*) Die Art und Weise der Gruppierung ergibt ein Blick auf Tafel besser, als eine detaillirte Beschreibung liefern könnte.

arks substanz gleichmässig abgeblasst, Papillen weisslich, Kelche
al Becken zeigen nichts abnormes.

Leber von ziemlich normaler Grösse, rechter Lappen
oll hoch, $6\frac{1}{2}$ Zoll breit, $2\frac{1}{2}$ Zoll dick, linker Lappen $5\frac{1}{2}$ Zoll
h, 2 Zoll breit, $1\frac{1}{2}$ Zoll dick. Auf dem Durchschnitt ist
Parenchym im Centrum braunroth mit leichtem Fettgehalt,
der Peripherie mehr schmutzig graugelb. Leichter Fettbe-
lag der Klinge beim Durchschneiden. Die Gallenblase
hält wenig goldgelbe Galle mit etwas Schleim.

Bei der nachträglichen Eröffnung des Schädels ergab
n folgendes: Schädelkappe sehr dünn, Diploë namentlich in
Schläfegegend fast vollständig geschwunden, die Gruben
die Meningealgefässe schmal aber sehr tief, am linken
mittelbein 2 flache Exostosen, die Näthe normal mit zahl-
chen Zacken. Dura mater etwas dicker als normal, im Sinus
gitudinalis etwas dunkles flüssiges Blut, Innenfläche beider-
ts normal. Auf der Scheitelhöhe der rechten grossen Hirn-
nisphäre findet sich ein erbsengrosser Cysticercus mit
chter Impression der darunter liegenden Hirnrinde
ed ein zweiter gleichgrosser unmittelbar an der Längs-
alte. Im übrigen sind die weichen Hirnhäute sehr dünn,
fässe stark gefüllt, in den Subarachnoidealräumen eine
ssige Quantität klarer Flüssigkeit. An der Basis des Gross-
d Kleinhirns die weichen Häute gleichfalls sehr zart, Blut-
ässe von normaler Beschaffenheit. Die beiden Seitenventrikel
wie der 3. Ventrikel normal gross, enthalten wenig klare,
öse Flüssigkeit. Zirbeldrüse klein und sehr reichlich mit
d durchsetzt. Plexus laterales sehr stark bluthaltig, auf
r rechten Seite eine Cyste mit klarem Serum. Die
isse Hirnsubstanz derb, zeigt ein verwaschenes, röthliches
orit, die graue Substanz von gesättigt gräurother Farbe.
e Blutgefässe enthalten dunkles, flüssiges Blut. Das Klein-
n fühlt sich derb und fest an, graue und weisse Substanz
gen ziemlich dasselbe Verhalten. Die Schnelligkeit, mit
leher die Obduction stattfinden musste, die Angehörigen
rteten während derselben auf die Einsargung der Leiche,
chte es leider unmöglich die Muskeln der Extremitäten alle
h Cysticerken zu untersuchen, um somehr, da sich die ganze
fmerksamkeit auf die im Mesenterium befindlichen con-
trirte.

Was den Sitz der Cysticerken im Mesenterium anbe-
gt, so ergab sich, dass dieselben nie frei zwischen den
atten des Mesenterium lagen, sondern stets mit den Lymph-
isen verwachsen waren. Bei den grossen Gruppen fanden
h vielfach 2—3 Drüsen verwachsen und zwischen diesen in
uppen und einzeln massenhaft Blasen, auch die kleinen

isolirten Blasen waren stets mit den Lymphdrüsen verwachsen. Blasen, die nicht mit Lymphdrüsen verwachsen waren, fanden sich nicht vor. Um die Frage zu entscheiden, ob die Blasen nur an der Drüse adhärirten oder innerhalb der Drüsensubstanz selbst liegen, wurde von dem Herrn Prof. Dr. Grohe und mir an dem im pathologischen Museum aufbewahrten Präparate eine sehr sorgfältige Untersuchung vorgenommen, wobei sich ergab, dass die Blase mit der Drüsenkapsel nur mittels ein lockerem Zellgewebes verwachsen war. An der Verwachsungsstelle zeigte die Drüse je nach der Grösse der Blase ein bald mehr flachen, bald mehr tiefen Eindruck. An den grösseren Blasen, namentlich da, wo 2—3 Blasen an einer Drüse zusammen lagen, war die Drüse ganz plattgedrückt und bildete vielfach nur wie einen kleinen Anhang an die Blasen selbst. Dieselben waren ferner vielfach in die Drüse so eingedrückt, dass es dem Bilde einer Eichel mit ihrer Cupula vollständig ähnlich sah.

Die von Herrn Prof. Dr. Grohe angestellte Untersuchung an den in Spiritus erhärteten Lymphdrüsen liess noch sehr deutlich Reticulum mit zahlreichen Lymphkörperchen erkennen. Nur bestand dasselbe aus einem dichten und feinen Netzwerk, dessen Maschenräume kleiner waren als normal.

Die Section ergab also Cysticerken:

im Gehirn an 3 verschiedenen Stellen,
im Lungenparenchym und auf der Pleura je eine,
in den Mesenterialdrüsen in der Nähe des Ileocoecum, in der Blinddarmstränge und des Ileum, und zwar zählte ich einundvierzig verschiedene Drüsen und Drüsenpaquete oder Gruppen, welche mit Cysticerken versehen waren, endlich in der Muskulatur des Thorax.

Ob in den andern Muskeln der Extremitäten und des Stammes auch noch Cysten vorhanden waren, konnte leider wie schon oben erwähnt, nicht constatirt werden.

Auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. Grohe nahm ich eine genaue Messung und Bestimmung der Cysticerken im Gehirn, der Thoraxmuskulatur und derer in den Mesenterialdrüsen vor. Einmal da es bei der verschiedenen Grösse der Blasen sich um Thiere von verschiedenem Alter handeln musste, zweitens um die Frage zu entscheiden, ob die Cysticerken im Mesenterium mit den in den andern Organen übereinstimmen oder ob dieselben, wie von mehreren Seiten angenommen wurde, verschieden sind.

Bevor ich auf das Resultat meiner Messungen näher eingehen will, ich eine kurze Mittheilung der wichtigsten hierher bezüglichen Resultate der Fütterungsversuche und Studien von Leuckart und anderen Autoren über Grösse und Beschaffenheit

bt der Cysticerken in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung geben.

Die kleinsten und wohl auch jüngsten Finnen*) beobachtete Leuckart nach 30—32 Tagen bei einem jungen Schweine, das zu dieser Zeit mit Bandwürmern inficirt war. Sie erschienen als kleine, runde Bläschen von 1 Mm. Länge und 0,7 Mm. Breite theils in der Leber, theils im Hirn, theils in den Muskeln. Nur in der Leber war dabei bereits eine eigene Kapsel bemerkbar, in den Muskeln fielen sie bei deren Trennung noch heraus. Die Anlage zur künftigen Kapsel war jedoch auch hier schon in einer dichten dieselben umgebenden Zone feinkörniger Substanz bemerkbar. Die Bildung des Kopfes beginnt nach Leuckart schon bereits um diese Zeit als sogenannter Kopfzapfen, welcher eine Einstülpung der Blasenwand ist. Derselbe wächst immer weiter nach innen bis zu einer Grösse von 0,2 Mm., dann trennen sich die beiden Blätter in der Einstülpung voneinander, das äussere wird zur Umhüllungshaut des Zapfens, das innere bleibt der eigentliche zukünftige Kopf und zukünftige Bandwurmbals und Leib. Derselbe wächst weiterhin schneller bis zu einer Grösse von 1,5—2 Mm. Er ist zwar schneller als das Receptaculum, das nur $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ dieser Grösse hat. Er liegt deswegen geknickt und am Ende trichtersackartig erweitert in demselben, hat vorn einen queren Schlitz, um welchen herum kranzförmig Kalkconcremente eingestreut sind. Gefässe sind von Leuckart auch schon um diese Zeit in ihm beobachtet worden. Darauf beginnt die definitive Entwicklung des Kopfes und zwar aus der schon erwähnten trichtersackartigen Erweiterung des Kopfzapfens, jedoch umgekehrt wie beim eigentlichen Bandwurmkopfe, der Hakenkranz nach unten und die Saugnäpfe etwas höher. Die Haken bestehen aus Ausstülpungen der Cuticula, die nach und nach in wohl ausgebildeten gekrümmten Haken werden. Ihre Festigkeit erhalten sie durch massenhaft eingestreute Kalkconcremente. Sie sind gruppirte um einen ringförmigen wulstigen Muskel das Rostellum und zwar so, dass beim Cysticercus mit eingestülptem Kopfe die Spitzen der Haken nach innen sehen, bei herausgestülptem Kopf und beim Bandwurmkopf nach aussen. Ihre Zahl schwankt bei Cysticercus cellulosae nach Angabe der meisten Autoren zwischen 28—32. Aehnlich entstehen auch die dieselben umgebenden 4 Saugnäpfe bei Cysticercus cell. Dabei hat natürlich auch Zapfen und Receptaculum immer an Grösse zugenommen, so dass ein derartig ausgewachsener Kopf bis 1,3 cm. misst. Ausserdem sind in ihm Muskeln und Gefässe vollständig ausgebildet und alles mit Kalkkörperchen wie besäet.

*) Leuckart, Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Band I. Leipzig 1863, S. 237—250.

Dies ist das Bild, welches der *Cysticercus* nach einer ohngefähr zweimonatlichen Entwicklung bietet, das Bild eines vollständig ausgewachsenen Bandwurmkopfes. Seine gewisse massen nun noch übrigen Kräfte concentrirt er daher lediglich weiterhin auf die Ausbildung des späteren Bandwurmeibes. Die Haltung der ausgebildeten Finne im Receptaculum ist von Leuckart sehr passend mit einer Spiraltour verglichen worden. Grosse Exemplare bringen es bis $1\frac{1}{2}$ Spiraltour. Sie ist der Haltung des Kopfpfahns vollständig ähnlich, nur dass statt der Knickung eine Biegung vorhanden ist. Der Leib wächst nun in den nächsten 2—3 Wochen wohl noch um das Doppelte seiner Länge und Breite, nimmt Kalkkörperchen auf u. s. w. Dabei wächst natürlich das Receptaculum mit, so dass es die grössten Finnen auf eine Länge von 10 Mill. und eine Breite von 2 Mill. bringen. Der Leib besteht aus einem hohlen muskulösen Schlauche mit zahlreichen Kalkconcrementen und zwei Paar parallel laufenden Gefässen, die am Kopfe zu einem Kreise zusammentreten. Die Breite des Leibes nimmt nach dem Halse hin ab. Derselbe charakterisirt sich durch circular nebeneinander gelagerte wellenförmige Falten. Auf dem Halse sitzt als rundliche Erhabenheit der Kopf. Ueber die Bewegungsfähigkeit der Finnen äussert sich Stieh*) folgendermaassen: die *Cysticerken* sind befähigt ihre Blase kräftig zu contrahiren und Hals und Kopf aus ihr einzustülpen. Eine vollständige Entwicklung der Finne d. h. eine solche, welche sie befähigt bei Uebertragung auf einen anderen Wirth sich als Bandwurm weiter zu entwickeln, findet man nach Leuckart S. 249 ohngefähr nach $2\frac{1}{2}$ Monat vor. Dabei schwankt ihre Grösse von der einer Erbse bis zu der einer Haselnuss. Die Aussenseite ist glatt. In den Muskeln liegt der Längsdurchmesser immer parallel dem der Muskelfaser. Normaliter liegt in jeder Blase nur ein Wurm, doch beobachtet schon der alte Goeze**) in einer Blase zwei Thiere. Ihre Lebensdauer ist nach Stieh S. 170 wahrscheinlich auf 3—6 Jahre beschränkt. Doch ist diese Beobachtung lediglich von *Cysticerken* der äusseren Haut und der Augen hergenommen. Sie leben nicht an geschützteren Stellen, den Körperhöhlen, zumal der Schädelhöhle länger leben, muss vorläufig noch dahin gestellt bleiben.

Ein Unterschied zwischen Menschen- und Schweinefinnen ist notorisch bis jetzt noch nicht festgestellt. Hingegen sind neuerdings von mehreren Seiten verschiedene Arten von menschlichen Finnen beobachtet und beschrieben worden.

*) Ueber das Finnigsein lebender Menschen. *Annalen des Charitékrankenhauses* 1854 S. 158.

**) Joh. August Ephraim Goeze, Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Blaukenburg 1782.

So will Köberle*) im Gehirn des Menschen einen neuen Cysticerus entdeckt haben, dessen Kopf mit der Taenia latissima übereinstimmt. Ebenso noch einen andern, dessen Rostellum eine starke, schwarze Pigmentirung zeigte. Letzteres hat Leuckart doch schon bei verschiedenen Taenien beobachtet. Endlich führt Davaine in seinem classischen Werke**) bei Besprechung der Cysticerque ladrique (pag. XXI) 4 Varietäten: „espèces ou variétés admises par plusieurs auteurs“ an, welche theils im Gehirn theils in der Chorioidea vorkommen sollen. Er legt aber denselben wie es scheint selbst keinen besonderen Werth bei, da sie nur kurz erwähnt sind.

Was nun die Häufigkeit des Vorkommens von Cysticerken im Menschen anbetrifft, so finden sich darin in Bezug auf Ort und Zeit merkwürdige Differenzen.

Rudolphi beobachtete in Berlin unter 250 Leichen 4—5 Fälle, Zenker in Dresden in späterer Zeit unter 168 Leichen nur einen Fall und Förster in Göttingen unter 639 vier, worunter 3 im Hirnfinnen. In Greifswald kamen nach den Beobachtungen von Prof. Grohe in einem Zeitraume von 14 Jahren unter circa 1100 Sectionen nur 2 Fälle von Cysticerus cellulosae vor, was gegenüber dem ausserordentlich häufigen Vorkommen von Echinococcus und Bandwürmern in Greifswald und der Provinz Pommern entschieden auffallend ist.

Am häufigsten wird das intermuskuläre Bindegewebe mit Einschluss des Herzens von den Cysticerken befallen, dann das cutane Bindegewebe, namentlich giebt Stieh eine Menge merkwürdige Fälle an, ferner die serösen Häute, die Leber, die Lunge, das Gehirn, die Nieren, die Augen, die Lymphdrüsen und sehr selten die Knochen. Eine Zahlangabe, wieviel Cysticerken ein Mensch haben könnte, ist fast unmöglich, denn oft findet man trotz vielen Suchens nur eine, während man in andern Fällen über die Menge der Finnen, die viele Hunderte, Tausende betragen kann, staunen muss.

Im vorliegenden Falle waren also, wie schon erwähnt, ausser den Mesenterialdrüsen im Gehirn, Lunge und Muskeln Cysticerken vorhanden. Davon standen mir leider nur die eine Blase an der Dura mater, die der Thorax-Muskulatur und die in Mesenterialdrüsen zu Diensten.

Ich nahm nun auf Rath des Herrn Professor Dr. Grohe folgende Messungen vor:

- a) Grösse der Blase.
- b) Grösse des Thieres nach Entfernung der Blase.
- c) Zahl der Haken.

*) L'Institut 1859, S. 124.

**) Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques. Paris, 1860.

d) Länge der grossen Haken

1. von der Krallenspitze bis zum hinteren Wurzelfortsatz,
2. von der Krallenspitze bis zum vorderen Wurzelfortsatz oder von der Spitze des vorderen Wurzelfortsatzes bis zum Ende des hinteren Wurzelfortsatzes.

e) Länge der kleinen Haken

1. von der Krallenspitze bis zum hinteren Wurzelfortsatz,
2. von der Krallenspitze bis zum vorderen Wurzelfortsatz, oder von der Spitze des vorderen Wurzelfortsatzes bis zur Spitze des hinteren Wurzelfortsatzes.*)

Und erhielt ich folgende Resultate:

Muskelcysticerken.

Grösse der Blase.	Grösse des Thieres.	Zahl der Haken.	1. Länge der grossen Haken.	2. Länge der grossen Haken.	1. Länge der kleinen Haken.	2. Länge der kleinen Haken.
15 Mill.	9 Mill.	28	0,160	0,080	0,15	0,05
13 Mill.	11 Mill.	30	0,1725	0,090	0,12	0,06
16,5 Mill.	6 Mill.	28	0,195	0,095	0,13	0,065
16,5 Mill.	10,5 Mill.	28	0,185	0,0925	0,12	0,06

Die Blase an der Dura mater.

5 Mill.	2 Mill.	28	0,165	0,0825	0,12	0,06
---------	---------	----	-------	--------	------	------

Die Cysticerken aus den Mesenterialdrüsen.

4 Mill.	0,75 Mill.	32	0,170	0,090	0,14	0,05
4,5 Mill.	1,5 Mill.	28	0,190	0,095	0,12	0,05
4 Mill.	1 Mill.	30	0,155	0,070	0,11	0,05
3 Mill.	1,25 Mill.	29	0,185	0,080	0,12	0,065
3 Mill.	1 Mill.	28	0,160	0,080	0,12	0,06
3,5 Mill.	1 Mill.	28	0,160	0,070	0,11	0,06

Die Grösse der einzelnen aus Lymphdrüsen und Cysticulusblasen bestehenden Pakete war sehr verschieden, so liess sich eines derselben an der Wurzel des Mesenterium dem Anfange des Ileum gegenüber, welches eine Länge von 58 Mill. und eine Breite von 30 Mill. hatte. Es bestand aus 11 kleinen und grösseren Drüsen, die mit lockerem Bindegewebe untereinander verbunden waren, welches unter dem Fingerdruck zerriss, es enthielt gegen 40 Cysticerken. Das nächst kleinste Paket hatte bloss noch 26 Mill. Länge und 17 Mill. Durchmesser und bestand bloss aus sieben Drüsen, meist kleinern, die Blase schätzte ich auf ohngefähr 25. Darnach gab es Pakete

*) Die Normalmaasse sind aus dem schon von mir angeführten Werke von Leuckart S. 259 u. f. genommen.

Die Messungen wurden mit einem grossen Mikroskope von Seibert und einem Ocular-Mikrometer von Nobert in Barth ausgeführt, die mein verehrter Lehrer, Herr Prof. Grohe bereitwilligst überliess.

1/2, 15, 14, 12 Mill. u. s. w. Das kleinste war fast vollständig rund und hatte $4\frac{1}{2}$ Mill. Umfang, es enthielt 5 Cysticerken. Doch gab es auch viele grössere, welche blos einen Arm enthielten.

Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass man in unserem Falle mehr als eine Infection annehmen muss, obwohl man wohl schliesslich annehmen konnte, dass die einen im intermusculären Bindegewebe einen bessern Boden zur Entwicklung gefunden hätten, wie die andern in den Lymphdrüsen des Mesenterium. Doch hat diese Annahme entschieden etwas Geringes. Noch wahrscheinlicher macht sich die Annahme der mehrfachen Einwanderung, wenn man bedenkt, dass der Patient ein Fleischergehilfe war, der wohl in seinem Berufe mehr als jeder andere Gelegenheit zur öftern Infection gehabt hätte.

Ueber die Identität der Cysticerken des Mesenterium mit denen in den andern Organen lässt schon die mikroskopische Untersuchung keinen Zweifel mehr übrig, zumal kann eine Verwechselung mit dem *Cysticercus tenuicollis**) wohl ausser Frage gestellt werden.

Gehen wir zur Besprechung des vorliegenden Falles über, ersieht man schon aus der obenangeführten Reihenfolge der von Cysticerken befallenen Organe, dass das Vorkommen derselben in Lymphdrüsen nächst dem in Knochen, welches ausserdem von Leuckart noch entschieden in Abrede gestellt wird,***) dem er behauptet, dass es sich lediglich um Echinococcen handeln könne, das bei weitem seltenste ist. Speciell von Mesenterialdrüsen, die man wohl als eine besonders ausgezeichnete Gattung letzterer ansehen muss, ist es uns nicht gelungen in der sehr reichen Literatur über diesen Gegenstand mehr als 2 Fälle***) zusammenzufinden. Im Allgemeinen werden die Mesenterialdrüsen bei der Aufzählung der Organe von den Autoren stillschweigen übergangen, was bei einer so in die Augen springenden pathologischen Veränderung und der sonst sehr vollständigen Literatur über diesen Gegenstand nicht möglich wäre, wenn man dasselbe öfter zu Gesicht bekommen hätte.

Alle 3 Fälle, der unsrige mitgezählt, sind mit Cysticerken in andern Organen (Gehirn, Lunge etc.) combinirt. Ueber den ersten Fall, dessen Krankengeschichte in ziemlichem Detail wieder gegeben ist, berichtet Stieh l. c. bei Aufzählung der Fälle von Gehirncysticerken; die Mittheilung desselben verdankte er seinem Freunde Heinrich Meckel. Ein

*) Leuckart l. c. Seite 320—321.

**) Leuckart S. 281.

***) Dieselben werden weiter unten einer speciellen Besprechung vorbehalten.

37 Jahr alter Gefangener hatte lange Zeit an Intermitter gelitten und zeigte bei seiner Aufnahme ins Krankenhaus deutliche Symptome von Gehirndruck. Er war müde, gähnte viel und starb unter tiefem Marasmus.

Bei der Section ergaben sich schon auf der äusseren Hautdecke an Schultern, Brust, Unterleib, Schenken zahlreiche Finnenblasen, die im subcutanen Zellgewebe lagen. „Sehr viele solche Blasenwürmer fanden sich in den verschiedenen Muskelbäuchen, gegen Tausende würden zu zählen gewesen sein.“ Im Herzen befindet sich ebenfalls 6—8. Im Gehirn 50—60 in die Windung eingebettet, die theilweise verkalkt, theilweise abgestorben mit einem weit reichenden Entzündungshofe umgeben sind. Die Lungen durchweg gesund enthalten keine Blasenwürmer. Hingegen „mehrere Cysticerken in der stark fibrös-speckiger, entzündlicher Demarkationskapsel in der Leber, den Nieren und mitten in einzelnen Lymphdrüsen des Mesenterium in der Nähe des Blinddarms, keine in der Milz, dem Peritoneum u. s. w.“

Ueber den zweiten Fall berichtet Dr. Fiedler in Dresden damals Prosector am städtischen Krankenhause, jetzt Leibarzt Sr. Majestät des Königs von Sachsen und Director des städtischen Krankenhauses, in E. Wagner's Archiv für Heilkunde vierter Jahrgang 1863 S. 268 u. ff. Er betrifft eine 49jährige Wittwe, die Ende August 1862 in das städtische Krankenhaus aufgenommen wurde. Aus Anamnese und Status praesens wurde die Diagnose auf allgemeine Tuberculose gestellt.

Der Verlauf der Krankheit rechtfertigte auch vollkommen dieselbe. Die Kranke gehörte bis zum Tage ihres Todes am 30. September desselben Jahres erfolgte, dem Krankenhaus an.

Die Section ergab „im Gehirn eine ohngefähr beengengrosse Cysticerkenblase, die in die Rindensubstanz eingebettet ist, eine gleiche kleinere runde findet sich eingedrückt an der untern Fläche des rechten mittleren Lappens und eine dritte an der untern Fläche der linken Hälfte des Kleinhirns, etwa von der Grösse einer Haselnuss.“ Im Kehlkopf eine Metatuberculöse Geschwüre, ebenso in der Trachea. — Auf der Lunge massenhafte Tuberkelknötchen. Herz normal gross mit einigen zottigen Sehnenflecken. Bauchhöhle mit Milz um die Hälfte vergrössert, Pulpa dunkelviolet, sehr mit zahlreichen Tuberkelknötchen von der verschiedenen Grösse. Leber mürbe, graugelblich und röthlichbraun mit Tuberkeln. Nieren normalgross, Kapsel leicht lösbar, in

stantia corticalis einige Tuberkelknötchen. Magen enthält g graugrüne schleimige Massen. Dünndarm mässig gefüllt vielen linsen- bis silbergroschengrossen tuberculösen Ge-
büren. Der Dickdarm mit Geschwüren im Colon ascendens. Mesenterialdrüsen fast durchaus bis zwei Haselnussgrösse ange-
rollen, auf dem Durchschnitt theils grauroth, theils grauweiss
g infiltrirt, viele in der Mitte eitrig zerfallen. In den
sen, welche in dem Mesenterium des untersten
iles des Ileum liegen, sowohl in denen nahe der
ergangsstelle des Mesenterium auf den Darm
auch nach der Wurzel zu finden sich in die Drü-
substanz eingebettet, entweder central oder peri-
risch, sehr zahlreiche erbsen- bis kirschkerngrösse
cysticerkusblasen. Die Zahl derselben beläuft sich
ohngefähr 25. In jeder Drüse ist nur eine Cyste.
enthalten sämtlich wohlgebildete mit schönem
nenkranz versehene Cysticerken. Eine isolirte
te findet sich im Mesocoeum und zwar hier im
gewebe zwischen beiden Blättern, nicht in eine
se eingebettet. Keine Cysticerken finden sich in
Muskeln und dem intermuskulären Zellgewebe,
gleich an den verschiedensten Stellen darnach
ucht wurde.

Das, was unsern Fall vor den beiden andern ganz be-
ters auszeichnet, ist erstens die bei weitem grössere
ahl der überhaupt Cysticerken enthaltenden Mesenterial-
len, und zweitens die in denselben enthaltene Anzahl
Cysticerken. Während in dem Falle von Stich und
ler nur einzelne, bei Letzterem sogar nur jedesmal eine
ige Blase in der hypertrophirten Drüsensubstanz einge-
et war, finden sich in unserm Falle bis zu 40 Blasen in
m Pakete von allerdings 11 Drüsen. Derselbe steht des-
en in dieser Beziehung einzig da.

Er wäre deshalb wohl auch zur Beurtheilung der patho-
schen Veränderungen, die durch Einwanderung der Cysti-
len in die Mesenterialdrüsen hervorgerufen werden könnten,
gnat. Doch ist das Unterstützungsmaterial dazu sehr
schwach. Einestheils wäre mit Hülfe der bis jetzt beobachteten
mitgetheilten Fälle selbstverständlich ein sicheres Urtheil
t auszusprechen, anderntheils kommt dazu, dass alle drei
e, ehe sie zur Beobachtung kamen, bereits in einem so
en Stadium anderweiter pathologischer Veränderungen
befanden, dass auch schon so die Reinheit des Schlusses
en würde.

Von den drei Fällen starb der eine an allgemeiner
perculose, einer chronischen Krankheit, der andere an Typhus

abdominalis, einer acuten. Aus der Anamnese unseres Patienten ist es sicher, dass derselbe zu der Zeit der, wie wir angenommen, verschiedenen Einwanderungen der Cysticerken vollständig gesund gewesen ist, denn er hatte seit einem kurzen Intermittens-Anfall in seinem 8. Lebensjahre absolut keine Krankheit überstanden. — Der Typhus konnte unmöglich dadurch bedingt werden, obwohl nach Virchow durch Wandern der Embryonen bei Helminthiasis typhusartige Erscheinungen hervorgerufen werden können, so mussten erst der Ausbildung des Kopfes nach die Cysticerken in Mesenterialdrüsen mindestens bereits vor 2 Monaten an dem Ziel ihrer Wanderung angekommen sein, zweitens hätten dieselben wohl kaum einen so typischen Verlauf eines Abdominaltyphus mit Roseola-Flecken etc. bewirken können. Ich muss also annehmen, dass eine derartige massenhafte Einwanderung von Cysticerken in die Mesenterialdrüsen ohne Einwirkung auf sein Befinden gewesen ist.

Am ehesten wäre man versucht aus dem Stiche des Falles Schlüsse zu ziehen. Der Kranke ging entschieden den Folgen von Cysticerken im Gehirn zu Grunde, die eine circumscripte Meningitis, soviel aus dem Sectionsberichte zu ersehen ist, hervorgerufen hatten.

Schliesslich wäre es auch nicht zuviel gesagt, wenn man seine Krankheit mit dem von Professor Mosler*) vorgeschlagenen Namen *Tabes helminthica* bezeichnete. Aber über Erscheinungen, die vom Mesenterium ausgehen könnten, über etwaige Verdauungsstörungen, Peritonitiden etc. wird nirgends, weder in dem einen noch in dem andern Falle berichtet. Ebenfalls wäre auch zwischen den Cysticerken und einer allgemeinen Tuberculose nach den jetzigen Anschauungen über die Ätiologie derselben ein Zusammenhang nicht herauszufinden.

Der beschriebene Fall hat also für die Geschichte der Cysticercuskrankheit beim Menschen folgende Thatsachen ergeben:

1. Der Cysticercus im Mesenterium ist derselbe gewesen wie der in den Muskeln, in dem Gehirn, den Lungen und auf der Pleura, nämlich der *Cysticercus cellulosae*.

2. Die Cysticerken im Mesenterium waren in einer unmittelbaren Verbindung mit den Mesenterialdrüsen, es konnte nicht nachgewiesen werden, dass dieselben innerhalb der Drüsensubstanz oder innerhalb erweitelter Blut- oder Lymphgefässe lagen.

*) Helminthologische Studien und Beobachtungen von Dr. med. Mosler, a. o. Professor in Giessen. Berlin 1864.

3. Der *Cysticercus* im Mesenterium hat trotz der massenhaften Anhäufung weder bei der Einderung dahin, noch in seinem weiteren Wachsthum Krankheitserscheinungen veranlasst, welche dem Träger des Parasiten zum Bewusstsein gekommen wären, noch hat derselbe im Mesenterium, Peritoneum oder den resp. Abschnitten des Darmkanals ostensible anatomische Veränderungen zur Folge gehabt.

Literatur.

- Leuckart, Die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten. Leipzig 1863.
- Mosler, Helminthologische Studien und Beobachtung. Berlin 1864.
- Davaine, Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques. Paris 1860.
- Goeze, Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Blankenburg 1782.
- Annalen des Charitekrankenhauses 1854, Ueber Finzigsein lebender Menschen.
- E. Wagner's Archiv für Heilkunde, Jahrgang 1863.
Ein Fall von *Cysticercus cellulosae* in den Mesenterialdrüsen, mitgetheilt von Dr. Fiedler.
-

Die Zeichnung der beigegebenen Lithographie ist nach dem frischen Präparat von C. Plötz und Prof. Grohe angefertigt.

Thesen.

I.

Die Anlegung des Darmrohres ist in der Rückenlage so wirksam wie in der Knieellenbogenlage.

II.

Der Carbolsäureverband ist bei grössern granulirenden Wunden nur mit Vorsicht anzuwenden.

III.

Die Anwendung von Serresfines ist nur bei oberflächlichen Wunden praktisch.

OPPONENTEN.

Herr Kade, Dr. med.

„ Peters, Drd. med.

„ Schauss, Drd. med.

Vita.

Felix Martin Oberlaender, evangelischer Confession Sohn des im Jahre 1868 zu Dresden verstorbenen Geh. Regierungsrathes Martin Gotthart Oberlaender und der Charlotte geb. Schumann, geboren am 8. Januar 1851 zu Dresden, besuchte vom Oktober 1865 bis Ostern 1870 das Gymnasium zu heiligen Kreuz daselbst und wurde Ostern 1870 mit dem Zeugniss der Reife von da entlassen. Hierauf studirte 4 Semester Medicin in Leipzig, alsdann 1 Semester in Halle. Im Winter 1872/73 wieder nach Leipzig zurückgekehrt, wozu tauschte ich im Sommer 1873 Leipzig mit Greifswald, wo ich von dem zeitigen Rector Prof. Dr. Franklin immatrikulirt und dem zeitigen Decan Prof. Dr. Grohe in das Album der medicinischen Facultät inscribirt wurde und meine Studien fortsetzte und beendete. Das Tentamen physicum bestand am 15. Juli 1872 in Halle unter dem Decanate des Prof. Volkmann, das Examen rigorosum am 15. März 1874 unter dem Decanate des Professor Dr. Mosler.

Ich erfülle noch die angenehme Pflicht an dieser Stelle allen meinen Herren Lehrern, insbesondere Herrn Prof. Dr. Grohe, der mir bei meiner Arbeit den hilfreichsten Beistand leistete, meinen innigsten Dank abzustatten. Während meiner Studienzeit besuchte ich die Collegien und Kliniken folgenden Herren Professoren und Docenten.

In Leipzig.

Dr. Bahrdt: Percussion und Auscultation.

Prof. Hankel: Physik, II Theile.

Prof. Kolbe: Anorganische Chemie.

Prof. Leuckart: Allgemeine Zoologie, vergleichende Anatomie.

Prof. Ludwig: Physiologie, II Theile.

Prof. Schwalbe: Gewebelehre, mikroskopische Uebungen.

Geheimer-Rath Prof. Thiersch: Specielle Chirurgie.

- Wenzel: Anatomie des Gehirns und Rückenmark's, Nervenlehre, Repetitorium der gesammten Anatomie.
f. E. H. Weber: Anatomische Präparirübungen, Eingeweidelehre, Ausgewählte Capitel aus der Eingeweidelehre.
f. E. Weber: Anatomische Präparirübungen, Knochen- und Bänderlehre.
f. E. Wagner: Specielle pathologische Anatomie, pathologisch-histologischer Cursus.

In Halle.

- f. Volkmann: Nerven- und Gefäßlehre.
f. Heintz: Chemisches Practicum.

In Greifswald.

- f. Grohe: Pathologisch-histologischer Cursus.
f. Hueter: Chirurgische Klinik, Operationslehre, Operationscursus, Ausgewählte Capitel der Knochen- und Gelenkrankheiten, Krankheiten der Wirbelsäule.
f. Häckermann: Gerichtliche Medicin.
f. Hänisch: Laryngoskopischer Cursus, Klinische Uebungen.
f. Krabler: Physikalische Diagnostik.
f. Mosler: Medicinische Klinik, über Nierenkrankheiten, über Kehlkopfkrankheiten, Physikalische Diagnostik.
f. Meier Rath Professor Pernice: Geburtshilfliche Klinik.
f. Schirmer: Augenärztliche Klinik, Cursus der Augenoperationen, Refractions- und Accommodationsstörungen.
f. Vogt: Fracturen und Luxationen, Operationscursus, chirurgische Verandlehre.
-







